


1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100



TÜRK KIZILAYI

1868

BİLGİ İÇİN
Çağrı Merkezi: 168
www.kanver.org



AIDS

HIV (Edinsel Bağışıklık Yetmezliği Virüsü)

AIDS

Etkeni HIV (Edinsel Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) olan bulaşıcı bir hastalıktır. Serolojik testlerde HIV pozitifliği virüs taşıyıcılığını ifade eder.

AIDS (Kazanılmış Bağışıklık Yetmezliği Sendromu)virüsün vücutta bağışıklık sistemini etkilemesi ile ortaya çıkan bir hastalık tablosudur.

Nasıl Bulaşır

Cinsel ilişki, kan yolu ve HIV pozitif anneden bebeğine gebelik, doğum ve/veya emzirme yolu ile bulaşır.

Belirtileri, Bağışıklığı baskılayıcı bir virüs olması sebebiyle fırsatçı enfeksiyonlar HIV'in belirtileri olabilir. Ağızda ve deride tekrarlayan uçuklar, lenf bezi büyümesi, uzun süreli ateş, kilo kaybı, gece terlemeleri, uzun süre geçmeyen ishal, aşırı yorgunluk, öksürük, menenjit, hepatit, cinsel organda uzun süre iyileşmeyen yaralar, kanserler gözlemlenebilir.

Not: Bu belirtilerin hiç biri sadece HIV virüsü etkilerine özgü değildir, başka hastalıkları da ifade edebilir; kesin tanı HIV testi ile konulur.

Bulaştıktan Sonra Ne Olur

Virüs vücuda girdikten hemen sonra hastalık tablosu oluşturmaz. Bulaş olduktan 2-6 hafta sonra tarama testleri ile hastalığın tanımlanmasını sağlayan antikorlar oluşur. Antikorlar oluşuncaya kadar test sonucu negatif çıkar ve kişi bu dönemde bulaştırıcıdır. Testin negatif ancak kişinin bulaştırıcı olduğu bu döneme pencere dönemi denir. Antikorlar oluşuktan sonra da hastalık tablosu oluşuncaya kadar belirtisiz bir dönem geçer; kişi bu süre boyunca HIV(+)dir ve bulaştırıcıdır.5-10 yıllık bu sürenin sonunda AIDS tablosu ortaya çıkar.

Nasıl Korunmalı

- Kan nakillerinde HIV testi yapılmış ve sonucu negatif çıkmış kan bileşenleri kullanılmalıdır.
- Enjektörler, berberlerde kullanılan jiletler, akupunktur iğneleri tek kullanımlık olmalı ve kullanıldıktan sonra atılmalıdır.
- Steril edilmemiş cerrahi ve diş hekimliği aletleri kullanılmamalıdır.
- Her türlü cinsel ilişkide prezervatif(kondom, kaput) kullanılmalıdır.
- Çok partnerli ve uyuşturucu kullanan kişilerle ilişkiye girmekten kaçınılmalıdır.

Nasıl Bulaşmaz

Tükürük, gözyaşı, ter, idrar, aksırık, el sıkışma, kucaklaşma, yiyecek, içecek, kaşık, çatal, tabak, telefon gibi eşyaların ortak kullanımı, tuvalet, duş, çeşme musluğu, yüzme havuzu, sauna ve hamamlar, sinek, sivrisinek, böcek sokması, hayvan ısırması **HIV bulaşmasına sebep olmaz.**

HIV Testi

HIV tanısında virüs vücuda girdikten sonra virüse karşı oluşan antikorların tanımlanmasına yönelik olan ELISA testi kullanılır. ELISA testi ile HIV (+) olduğu tespit edilen kişinin kanına Western-Blot testi uygulanarak doğrulaması yapılır.

HIV (+) olduğunu bilen ve ya kendisine HIV bulaştığı şüphesi olan kişiler kan bağışlamamalıdır. HIV (+) biri ile cinsel ilişkisi olanlar kan bağışlamamalıdır.

Herhangi bir şüpheniz dolayısıyla yalnızca test sonucunuzu öğrenmek için kan bağışında bulunmayınız.